

Zatiranje plevelov v žitih

Varstvo rastlin:

Axial One

Axial

Alliance

Starane Forte

Žita

18.03.2019



V kolikor v jesenskem času v posevkih žit niste uspeli zatreti plevelov, je **nastopil pravi čas za uporabo herbicidov**. Zelo pomembno je, da plevela odstranimo čim prej spomladi, ko še ne povzročajo gospodarske škode; to pomeni do konca razraščanja žit oziroma do pojava prvega kolenca.

Večina posevkov je močno zapleveljenih, bodisi samo s širokolisnimi pleveli ali pa se poleg letih v večjem ali manjšem obsegu pojavljajo tudi ozkolistni pleveli.

Ovisno od plevelov, ki prevladujejo na posamezni njivi, je mogoče uporabiti različne kombinacije:

- Za celovito zatiranje tako travnih kot širokolistnih plevelov priporočamo kombinirani pripravek **Axial One v odmerku 1 l/ha**. Axial One učinkovito zatira celotni spekter travnih plevelov, hkrati pa odlično deluje na nekatere trdovratne širokolistne plevela, kot so: smolenec, navadna zvezdica, kamilice, navadni plešec. Registriran je za uporabo

v pšenici in ječmenu. V primeru močnejše zapleveljenosti z mrtvo koprivo, jetičniki in vijolico oz. v primeru že močno razvitih plevelov priporočamo dodajanje pripravka **Alliance v odmerku 75 g/ha**.

- Izredno učinkovita je kombinacija pripravkov **Axial 0,6 - 0,9 l/ha + Alliance 100 g/ha**. Axial je pripravek, namenjen za zatiranje najširšega spektra ozkolistnih plevelov (srakoperec, njivski lisičji rep, juljke, divji oves) v pšenici in ječmenu. Za razširitev delovanja na celoten spekter plevelov, tudi širokolistnih, priporočamo kombiniranje s pripravkom Alliance.
- **Axial** je zaradi prilagodljivega časa uporabe odlična izbira za poznejša korekcijska škropljenja proti travnim plevelom. Izjemna selektivnost zagotavlja najvišjo varnost za pšenico in ječmen tudi v poznejših terminih uporabe (možnost uporabe vse do pojava zastavičarja BBCH 39).
Odmerek:
 - 0,6 - 0,9 l/ha za zatiranje srakoperca in gluhega ovsa,
 - 0,9 - 1,2 l/ha za zatiranje ljulk in lisičjega repa.
- Za **korekcijska škropljenja**, predvsem za reševanje težav s smolencem (Galium aparine), navadnim slakovcem (Polygonum convolvulus) in njivskim slakom (Convolvulus arvensis) priporočamo uporabo pripravka **Starane Forte v odmerku 0,54 l/ha**, dovoljena uporaba v fazi BBCH 21 - 32.