





# Program škropljenja vinske trte 2019

Razvojne faze trte	Črna pegavost	Peronospora	Oidij	Botritis	Sukači	Škržati	Pršice
 Brstenje			<b>Thiovit Jet®</b> 3,0 - 8,0 kg (učinkovit tudi proti pršicam)				
 2 - 10 cm	<b>Universalis®</b> 1 l/ha	ali <b>Nordox 75WG®</b> 1,0 kg/ha	<b>Thiovit Jet®</b> 3,0 kg/ha				<b>Vertimec PRO®</b> 0,75 l/ha
 Mladice 10 - 30 cm		<b>Universalis®</b> 1,5 l/ha	<b>Thiovit Jet®</b> 2,0 - 3,0 kg/ha				
 Mladice 40 - 70 cm		<b>Ampexio® **</b> 0,5 kg/ha ali <b>RidomilGold® MZ</b> 2,5 kg/ha	<b>Topas® **</b> 0,3 l/ha + <b>Thiovit Jet®</b> 2,5 - 3,0 kg/ha				
 Pred cvetenjem		<b>RidomilGold® MZ</b> 2,5 kg/ha	<b>Topas® **</b> 0,3 l/ha + <b>Thiovit Jet®</b> 2,5 - 3,0 kg/ha		1. rod <b>Affirm®*</b> 1,5 kg/ha		
 Po cvetenju		<b>PergadoF®</b> 2,5 kg/ha ali <b>Ampexio® **</b> 0,5 kg/ha	<b>Dynali® **</b> 0,65 l/ha + <b>Thiovit Jet®</b> 2,5 - 3,0 kg/ha				
 Rast jagod		<b>PergadoF®</b> 2,5 kg/ha ali <b>PergadoMZ®</b> 2,5 kg/ha	<b>Dynali®</b> 0,65 l/ha + <b>Thiovit Jet®</b> 2,5 - 3,0 kg/ha	<b>Switch®</b> 1,0 kg/ha (0,6 kg/ha - samo v coni grozdja)			
 Pred zapiranjem grozda		<b>Universalis®</b> 2,0 l/ha	<b>Thiovit Jet®</b> 3,0 - 4,0 kg/ha		2. rod <b>Affirm®*</b> 1,5 kg/ha		
 Zapiranje grozda		<b>PergadoC®</b> 5,0 kg/ha	<b>Thiovit Jet®</b> 3,0 - 6,0 kg/ha			<b>Reldan®*</b> 1 l/ha oz. v skladu z uredbo	
 Začetek zorenja		<b>Nordox 75WG®</b> 1,6 kg/ha ali <b>Ampexio® **</b> 0,5 kg/ha	<b>Thiovit Jet®</b> 3,0 - 6,0 kg/ha				
 Zorenje				<b>Switch®</b> 1,0 kg/ha (0,6 kg/ha - samo v coni grozdja)			

\* po napovedi prognostične službe, \*\* v skladu z antirezistenčno strategijo je dovoljena trikratna uporaba triazolov in mandelamidov v eni rastni dobi.



Opomba! Pred uporabo FFS obvezno prebrati navodilo za uporabo. Vse količine so priporočene glede na fenofazo trte ob predpostavki 4000 trt/ha. Predlagani škroplilni program je okviren in ga je potrebno prilagoditi glede na nasad (sorta, bujnost), mikro - klimo in vremenske pogoje. Predvidena poraba vode s škroplilnico je za obdobje: od brstenja do mladice velikosti 30 cm = 400 - 600 l/ha; v času velikosti mladice 30 - 50 cm do konca cvetenja = 600 - 800 l/ha; od konca cvetenja naprej = 800 - 1000 l/ha. Okvirni razmiki med škropljenji so 8 - 12 dni, vendar jih je potrebno prilagoditi glede na prirast vinske trte, padavine in glede na pritisk bolezni. Kadarkoli vam vremenski pogoji dovoljujejo, je za uspešno varstvo pred oidijem pri vsakem škropljenju priporočljivo dodajati žveplo (Thiovit Jet).